



Elenco FAQ

[Cosa si deve fare se si viene punti?](#) [1]

Per alleviare il fastidio e il prurito procurato dalla puntura di questo insetto, si consiglia semplicemente di lavare e disinfettare la zona punta, fare impacchi con ghiaccio o all'occorrenza applicare una crema antistaminica o cortisonica.

Nei bambini e nei soggetti più sensibili, la puntura di zanzara tigre può talvolta creare reazioni allergiche o infezioni localizzate, con possibile innalzamento della temperatura corporea: anche queste manifestazioni possono essere facilmente curate, consultando in questo caso il medico di base.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Cos'è il virus Chikungunya?](#) [3]

La Chikungunya è una malattia virale acuta, di origine tropicale, che ha caratteristiche similinfluenzali quali: febbre, cefalea, nausea, stanchezza e soprattutto dolori articolari.

Accanto ai sintomi simil-influenzali e ai dolori articolari, nella maggior parte dei casi compaiono pomfi pruriginosi, che possono arrossarsi ed essere molto fastidiosi.

Generalmente, la malattia ha andamento benigno: i sintomi si risolvono in 3/5 giorni, anche se il senso di stanchezza e i dolori articolari possono persistere per più tempo. Per la cura di questo virus, non esistono trattamenti specifici; si usano solo farmaci sintomatici come: anti-piretici, anti-infiammatori (ad eccezione dell'aspirina), riposo a letto, reintroduzione di liquidi (ove necessario).

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Come può essere trasmessa la Chikungunya?](#) [4]

Il virus responsabile della Chikungunya è un togavirus (arbovirus) che viene veicolato e trasmesso dalla Zanzara Tigre. Questa zanzara può trasmettere l'infezione pungendo una persona malata in fase acuta: in questo modo si infetta e, pungendo un'altra persona, può trasmettere il virus. Il virus in questione, però, non si trasmette da persona a persona con i normali contatti della vita quotidiana.

La febbre da Chikungunya fu segnalata la prima volta nel 1952 in Tanzania, a seguito di alcuni focolai epidemici, che in periodi successivi furono registrati anche in Asia ed in Africa.

Nelle ultime settimane di agosto 2007, la Chikungunya è stata notificata anche in alcune frazioni dell'Emilia-Romagna (provincia di Ravenna), presumibilmente importata da un soggetto che aveva soggiornato all'estero (India), dove aveva contratto la malattia.

In Lombardia non esistono focolai di questa malattia.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Cosa si può fare per non essere punti?](#) [5]

L'attività della Zanzara Tigre è massima nella fascia oraria che va dal tramonto all'alba. Tenendo conto di questo e dei segnali che inducono le zanzare a pungere un soggetto piuttosto che un altro (vd. Domanda n. 9), è bene seguire alcuni accorgimenti e misure precauzionali, quali:

- vestirsi con indumenti chiari e in fibre naturali, che coprano la maggior parte del corpo, ogni qual volta si frequentano spazi aperti e/o circondati da verde;
- non utilizzare profumi o deodoranti ad essenze dolci che attirano le zanzare e lavarsi preferibilmente con sapone neutro o di Marsiglia;
- evitare le aree a maggior rischio di infestazione (zone verdi e con ristagni d'acqua), quando si fa attività fisica;
- coprire le parti del corpo che rimangono esposte con repellenti per le zanzare;
- alloggiare in ambienti con climatizzatore o in assenza di questo fare uso di zanzariere;
- in casi estremi, spruzzare insetticidi a base di piretro o permetrina nelle stanze dove si soggiorna o fare uso di diffusori di insetticida elettrici, avendo cura di areare i locali prima di soggiornarvi.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Se si tagliano le siepi, si sfalcia l'erba e si potano gli alberi delle aree verdi, è possibile eliminare la presenza di zanzare?](#) [6]

Siepi, alberi ed erba alta costituiscono gli ambienti nei quali la Zanzara Tigre adulta si riposa e si ripara, pronta ad entrare in azione al passaggio dell'essere umano o di un'altra preda; non costituiscono i focolai, ovvero i luoghi di sviluppo e proliferazione.

Pertanto, può essere utile potare o tagliare siepi, alberi ed erba alta, ma ciò non costituisce una soluzione al problema.

È invece necessario eliminare i ristagni d'acqua.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Quali sono i segnali che attirano maggiormente la Zanzara Tigre, inducendola a pungere un soggetto piuttosto che un altro?](#) [7]

La zanzara riconosce le sue prede dall'odore di alcune sostanze emesse dal corpo, quali l'odore corporeo e l'acido lattico contenuto nel sudore, l'anidride carbonica emessa durante la respirazione, la temperatura che circonda il bersaglio, ecc.

Inoltre, la Zanzara Tigre è indirizzata sulla vittima anche da altri segnali visivi: forma corporea in movimento, colori scuri, ecc.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[La puntura di Zanzara Tigre può creare problemi di salute?](#) [8]

Nel nostro Paese, la puntura di Zanzara Tigre non è veicolo di alcuna malattia infettiva, ma semplicemente fonte di fastidio.

Essa causa la comparsa di pomfi pruriginosi più o meno numerosi ed importanti a seconda della sensibilità del soggetto.

Anche eventuali reazioni allergiche, infezioni o innalzamento della temperatura corporea (nella peggiore delle ipotesi) sono sintomi sempre curabili con antistaminici; in questi casi, comunque, si consiglia di rivolgersi al medico di base.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Quali sono le condizioni e i luoghi che favoriscono l'attività della Zanzara Tigre?](#) [9]

Il clima caldo umido e la presenza di raccolte d'acqua stagnante, tipiche dell'ambiente urbano (bottiglie, barattoli, sottovasi, pneumatici, caditoie, ecc.), sono i principali fattori che favoriscono lo sviluppo e la proliferazione della Zanzara Tigre.

Gli adulti di Zanzara Tigre generalmente preferiscono spazi aperti, stando al riparo, in ambienti freschi e ombreggiati, soprattutto tra l'erba alta, le siepi e gli arbusti, in attesa del passaggio di una "preda".

Negli ultimi anni sono però cresciute le segnalazioni della presenza di zanzare anche in zone assolate come i parcheggi dei supermercati o le aree industriali in cui ci sono pochi alberi.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Come e dove si sviluppa la Zanzara Tigre? È possibile sconfiggerla definitivamente?](#) [10]

La Zanzara Tigre depone le uova sulle pareti interne di qualsiasi pozza o contenitore ove vi sia acqua stagnante; quando vengono sommerse dall'acqua, le uova si schiudono e in una/due settimane le larve si trasformano in zanzare adulte. Nella lotta alla zanzara tigre sono fondamentali la prevenzione e la collaborazione di tutti: non si può pensare di eliminare completamente il fenomeno, ma evitando tutte le possibili raccolte d'acqua si può certamente controllare e ridurre la diffusione della Zanzara Tigre sul territorio.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

[Qual è il periodo di attività della Zanzara Tigre?](#) [11]

Il ciclo biologico della Zanzara Tigre si estende all'incirca da aprile a novembre, a seconda delle temperature, ma la densità massima si ha solitamente da metà agosto a metà settembre. Nella stagione calda, gli adulti colpiscono di giorno, soprattutto nelle ore più fresche della giornata e all'aperto.

Categoria di FAQ: [Zanzara tigre](#) [2]

Pagine

[1](#)

[2](#) [12]

[seguinte >](#) [12]

Collegamenti

- [1] <https://www.comune.cremona.it/node/403714>
- [2] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/395>
- [3] <https://www.comune.cremona.it/node/403715>
- [4] <https://www.comune.cremona.it/node/403716>
- [5] <https://www.comune.cremona.it/node/403717>
- [6] <https://www.comune.cremona.it/node/403711>
- [7] <https://www.comune.cremona.it/node/403712>
- [8] <https://www.comune.cremona.it/node/403713>
- [9] <https://www.comune.cremona.it/node/403615>
- [10] <https://www.comune.cremona.it/node/403616>
- [11] <https://www.comune.cremona.it/node/403617>
- [12] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/395?page=1>